Lithobius (Monotarsobius) taschevi Matic & Golemansky est un synonyme de *Lithobius (Monotarsobius) beroni* Negrea *(Chilopoda, Lithobiomorpha)*

par

Ştefan Negrea

En comparant les descriptions des espèces *Lithobius* (*M.*) *beroni* Negrea et *L.* (*M.*) *taschevi* Matic & Golemansky, l'auteur constate qu'il s'agit de la même espèce. Il établit que c'est *L.* (*M.*) *beroni* qui est le nom de cette espèce, l'autre n'étant qu'un synonyme de celui-ci, et il présente ses caractères.

En 1965 ont paru deux travaux dans lesquels sont décrites de nouvelles espèces de Lithobiidae de Bulgarie. Dans un de ces travaux (Negrea, 1965) est décrite l'espèce *Lithobius* (*Monotarsobius*) *beroni*, n.sp., et dans l'autre (Matic & Golemansky, 1965) *L.* (*M.*) *taschevi* n.sp. En comparant les descriptions et les dessins de ces espèces nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit de la même espèce *, qui présente les caractères suivants :

Longueur 6—9 mm. Coloration générale du corps jaune-marron. Tête aussi longue que large, à sillon frontal évident. Antennes courtes, formées de 30—41 articles. Ocelles en une rangée formée généralement de quatre ocelles pigmentés, l'ocelle n° 2 étant le plus gros. Organe de Tömösváry circulaire, de la grosseur d'un ocelle ou plus petit. Coxosternum forcipulaire à bord rostral proéminent, armé de 2 + 2 dents coni-

* Matic et Golemansky (1967, p. 93) note en passant que l'espèce *L.* (*M.*) *beroni* serait synonyme de *L.* (*M.*) *taschevi*, sans soutenir cette affirmation par des arguments et sans établir la priorité du nom conformément au Code International de Nomenclature Zoologique en vigueur.

Trav. Inst. Spéol. «Emile Racovitza», t. X, p. 231—233, Bucarest, 1971

ques, bien distancées entre elles; en outre 1 + 1 épines (porodontes) assez puissantes. Les tergites ont les angles arrondis ou presque droits; ils sont lisses, non ponctués et de coloration unie.

Les pores coxaux sont circulaires, au nombre de 1—3 (fréquemment 2—3). Les tarses des pattes 1—10 simples; P.11 avec trace d'articulation; P.12 à tarse biarticulé, ayant une articulation non fonctionnelle. P.13—15 à tarses biarticulés et articulations fonctionnelles. P.14—15 du type *Monotarsobius*, c'est-à-dire gonflées, y compris les tarses qui ne sont pas beaucoup plus grêles que le tibia (exception faite les tarses des pattes terminales du mâle qui sont parfois relativement minces). P.14—15 ont sur la face interne des fémurs, des tibias et des tarses, de nombreux pores glandulaires; des pores isolés peuvent exister aussi sur P.12—13. Pattes terminales (P.15) à griffe secondaire grande; sans épines coxolatérales. P.14—15 sans structures sexuelles secondaires.

La spinulation des pattes:

$$\text{P.1}\ \frac{- - - (a)\ a}{- - - - (m)}; \qquad \text{P.2}\ \frac{- - - a(p)\ a(p)}{- - - (m)\ m}$$

$$\text{P.14}\ \frac{- - mp\ \ - \ \ -}{- m\ (a)mp\ (a)m\ -}; \qquad \text{P.15}\ \frac{- - mp\ - -}{- m\ amp\ m\ -}$$

Appendices génitaux des femelles armés de 2 + 2 éperons cylindro-coniques courts et obliquement tronqués et d'une griffe apicale courte et large, tridentée, dont les dentelures latérales, subégales, sont à peu près au même niveau. La face interne des gonopodes glabre; du côté dorsal, sur le 2ème et le 3ème article il y a 1—3 soies-épines.

Comme il est question de la priorité du nom (*L. beroni* ou *L. taschevi*) j'ai cherché la date d'apparition de ces publications. La description de l'espèce *L. beroni* a paru dans « Fragmenta Balcanica » (Skopje), n° 14 du 1.IX.1965. La description de l'espèce *L. taschevi* a paru dans « Annuaire de l'Université de Sofia », vol. 58, livre 1, qui porte seulement l'année de la parution, c'est-à-dire 1965. Conformément au Code International de Nomenclature Zoologique (adopté par le XV[e] Congrès International de Zoologie — 1964), article 21 (b) « si la date de publication n'est pas complètement spécifiée on doit l'interpréter comme... le dernier jour de l'année, lorsque l'année seule est spécifiée ». Par conséquent, la date de parution de la description de l'espèce *L. taschevi* doit être considérée le 31.XII.1965. En conclusion, *L.* (*M.*) *beroni* est le nom de cette espèce, l'autre n'étant qu'un synonyme de celui-ci.

Bibliographie

1965 Negrea Şt., *Contribution à l'étude des Lithobiidae (Chilopoda) de Bulgarie.* Fragmenta Balcanica, V, *14*, 91—104.

1965 Matic Z., Golemansky V., *Nouvelle contribution à la connaissance des Lithobiides (Chilopoda, Lithobiomorpha) en Bulgarie.* Ann. de l'Université de Sofia, **58**, *1*, 13—28.

1967 MATIC Z., GOLEMANSKY V., *Le sous-genre Monotarsobius (Chilopoda, Lithobius) en Bulgarie*. Bull. de l'Inst. de Zool. et Musée, **XXIV**, 39—50.

* *Code International de Nomenclature Zoologique adopté par le XV^e Congrès International de Zoologie*, published for the Int. Commission on Zoological Nomenclature

* * by the Int. Trust for Zool. Nomenclature, London, 1964.

Institut de Spéologie « Emile Racovitza »
Bucarest

Reçu le 15 février 1971