Tableau 1

ÉCHELLE STRATIGRAPHIQUE			ROUMANIE					U. R. S. S.		
			Etages	BIOZONES MOLLUSQUES	BIOZONES MAMMIFÈRES		LOCALITÉS TYPE	Etages	HORIZONS	BIOZONES MOLLUSQUES
PLIOCÈNE supérieur	PLÉISTOCÈNE inférieur	OLDUVAI	PLÉISTOCÈNE inférieur	QM_2 — Bogatschevia sturi	Archidiskodon meridionalis	T. boisvilletti boisvilletti — Citellus primigenius M. coelodus	IZVORU	APCHÉRONIEN inférieur	BOCHERNITZIEN	B. sturi
		1,6		QM_1 — Unio apscheronicus		T. boisvilletti dacicum	SLATINA-3		DOMACHKINIEN	U. apscheronicus
		1,8	ROMANIEN supérieur	NSM_{12d} — Bogatschevia tamanensis — Rugunio riphaei	Archidiskodon gromovi	D. milleri milleri — M. polonicus — pliocaenicus; M. minor ssp. 2	CHERLEȘTII — MOȘTENI; SLATINA-2	AKTCHAGYLIEN moyen supérieur	FERLADANIEN	B. tamanensis
				NSM_{12c} — Unio kujalnicensis		Doiomys milleri ssp. — M. minor ssp. 1	SLATINA 1 CLOCOCIOV (c.6)		KRYJANOVKIEN	U. kujalnicensis
				NSM_{12b} — Ebersininaia geometrica — Bogatschevia pretamanensis			CLOCOCIOV (c.4)		AKKOULAÉVIEN	E. geometrica
		2,43		NSM_{12a} — Ebersininaia milcovensis — Viviparus turritus		Mimomys gr. minor	MILCOVU DIN VALE		TCHISTOPOLIEN	E. sculpta
		MATUYAMA	moyen	NSM_{11d} — Cuneopsidea iconomianus	"Archidiskodon" rumanus	Pliomys hungaricus	PODARI; CERNĂTEȘTI	AKTCHAGYLIEN inférieur	PORATIEN SUPÉRIEUR	C. sudovskii
		2,8								
		2,9								
		GAUSS KAENA								

Tableau 1 — Corrélations des niveaux fossilifères de la zone de Slatina.