

Fig. 1. — *Microtus (Allophaiomys) pliocaenicus* (Kormos)
M_1, face occlusale : a, c, d, h, i, k, sin. ; b, e—g, j, l—s, dext.
Morphotypes : a, b, « *deucalion* » ; c, « *praelaguroides* » ; d, e, « *laguroides* » ; f, *latilaguroides* ; g, « *cololaguroides* » ; h—l, « *pliocaenicus* » ; m, « *mesarvalidens* » ; o, « *mesonivalis* » ; n, *p*—s, « *praehintoni* ».





Fig. 3. — *Lagurus praepannonicus* Topatchevski
M_1, face occlusale : a—f, i, m, p—r, t, dext. ; g, h, j—l, n, o, s, u, sin.
Morphotypes : a—c, « *arankae* » (a, avec « Mimosinuïde » non entamé par l'usure) ; d—k, « *praepannonicus* » (g, à ébauche de repli mimomyen) ; l — q, « *pannonicus* » (p, exemplaire juvénile ; p', même exemplaire, face alvéolaire) ; r—u, « *transiens* ».



Fig. 2. — *Microtus (Allophaiomys) pliocaenicus* (Kormos)
Histogramme de répartition des LM_1.



Fig. 4. — *Lagurus praepannonicus* Topatchevschi
Histogramme de répartition des LM_1.